

CLASIFICACION DE LOS TRANQUILIZANTES

1. Derivados fenotiazínicos
2. Derivados reserpínicos
3. Derivados del difenilmetano
4. Derivados carbámicos
5. Grupo misceláneo.

TALLERES GRAFICOS



QUITO - ECUADOR

3 int 42127

Tabla V

ESTRUCTURA QUIMICA Y ALGUNOS EFECTOS COLATERALES DE LOS MAS IMPORTANTES DERIVADOS CARBAMICOS









Droga	$ \begin{array}{c} \text{CH}-\text{O}-\text{CO}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \end{array} $			Somnolencia	Efectos Extrap.	Ataxia	Discrasias sanguíneas
MEPROBAMATO (MILTOWN, EQUANIL) (400 mg)	CH ₃	CH ₂ -CO-NH ₂	C ₃ H ₇	2	↓	0	1
CARISOPRODOL (SOMA) (300 mg)	CH ₃	CH ₂ -O-CO-NH-CH(CH ₃) ₂	C ₃ H ₇	1	↓	0	-
METOCARBAMOL (ROBAXIN) (300 mg)	H	CH ₂ -O-C ₆ H ₄ -OCH ₃	OH	0	↓	0	-
ECTILUREA (NOSTIN, LEVANIL) (100 - 300 mg)	=CH-CH ₃	CH ₂ -CH ₃		1	0	0	-
CROTONILUREA (CENESTIL)	Idem	CH(CH ₃) ₂		1	0	0	-
	$ \begin{array}{c} \text{O}-\text{CO}-\text{NH}_2 \\ \\ \text{C} \\ / \quad \backslash \end{array} $						
EMILCALMATO (ESTRIATAM) (200 mg)	CH ₃	CH ₂ -CH ₃	CH ₂ -CH ₃	1	↓	0	-
ESTIRAMATO (SINAXAR) (200 mg)	H	-CHOH-C ₆ H ₅	H	1	↓	0	-

↓ Efectos anticonvulsivantes.

Tabla VI

ESTRUCTURA QUIMICA Y ALGUNOS EFECTOS COLATERALES DE UN GRUPO

MISCELANEO DE TRANQUILIZANTES

Droga	Somnolencia	Efectos Extrap.	Ataxia	Discrasias sanguíneas	Droga	Somnolencia	Efectos Extrap.	Ataxia	Discrasias sanguíneas
 CLORMETAZANONA (TRANCOPAL) 100 mg.	0	↓	2	-	 MEFENOXALONA (TREPIDONE)	1	1	0	-
 ZOXAZOLAMINA (FLEXIN) 250 mg.	2	↓	2	-	 CLORDIAZEPOXIDE (LIBRIUM)	1	↓	1	1
 BENZOQUINAMIDA (CUANTRIL)	0	0	1	-	 DIAZEPAM (VALIUM)	1	↓	1	1
	2	↓↓	2	-		1	↓	0	-