

### ALERGIA EN NIÑOS

- 1) BASTANTE FRECUENTE
- 2) CUADRO CLINICO USUALMENTE NO REVISTE GRAVEDAD.
- 3) EN 1A. INFANCIA MAS FRECUENTES DERMATOPATIAS.
- 4) DESDE 2A. INFANCIA MAS FRECUENTES ALERGIAS RESPIRATORIAS.

T 8  
TABLA I

ANTIHISTAMINICOS:

ESCALA DE EFECTIVIDAD TERAPEUTICA

1) EFFECTIVOS EN:

URTICARIA, DERMOGRAFISMO,  
ANGIOEDEMA.  
RINITIS (ESTACIONAL, PERENNE,  
VASOMOTORA)  
CONJUNTIVITIS ALERGICA  
REACC. ANAFILACT. (+ ADRENALINA)  
PREVENCION REAC. ALERG. SANGUIN.

2) PROBABLEMENTE EFECTIVOS EN:

PRURITO POR REACC. POR DROGAS  
REAC. LOCAL POR PICAD. INSECTOS  
ALERGIA FISICA

3) POSIBLEMENTE EFECTIVOS EN:

TOS POR ESPASMO BRONQUIAL  
ASMA  
DERMATITIS: ATOPICAS; POR CONTACTO  
NEURODERMATITIS  
ECZEMAS ALERGICOS  
DERMATITIS PRURIGINOSAS

Escala establecida en reuniones auspiciadas  
por la Academia Nacional de Ciencias y el  
Comité Nacional de Investigaciones de Drogas  
de los EE.UU.

## TRASTORNOS NEUROVEGETATIVOS

- A. ANTICOLINERGICOS: SEQUEDAD DE LA BOCA; ESPESAMIENTO SECREC. BRONQ.; DILATAC. PUPILA; VISION BORROSA.
- B. OTROS: MAREO, VERTIGO, TINITUS.
- C. GASTRO-INTESTINALES: NAUSEA, VOMITO, DIARREA; CALAMBRE GASTRICO, CONSTIPACION.

## TRASTORNOS NERVIOSOS CENTRALES

- A. DEPRESION: DE ACTIVIDAD MENTAL, SOMNOLENCIA, ATAXIA, NARCOLEPSIA, COMA.
- B. ESTIMULACION: INSOMNIO, IRRITABILIDAD, NERVIOSISMO, HIPERREFLEXIA, CONVULSIONES.
- C. OTROS: SUEÑOS Y PESADILLAS, DELUSION, ALUCINACION, CONFUSION, PSICOSIS TOXICA.

### EFFECTOS DEPRESIVOS EN NIÑOS

- 1) ATURDIMIENTO, MAREO, PUEDE CAERSE
- 2) SOMNOLENCIA, DUERME EN HORAS NO ACOSTUMBRADAS. NO SE DESPIERTA, HAY QUE LEVANTARLO. SE DUERME EN LA ESCUELA.
- 3) DEPRESION MENTAL, NO PUEDE ATENDER LA CLASE.

### EFECTOS TOXICOS

POCO MARGEN SEGURIDAD: DIFENHIDRAMINA

AMPLIO MARGEN SEGURIDAD: TERFENADINA,  
CLORPIRIDAMINA, CLEMASTINA.

SINTOMAS: PROFUNDA DEPRESION SNC.  
EPISODIOS CRISIS CONVULSIVAS.

## FRECUENCIA DE EFECTOS COLATERALES

ANTIHISTAMINICOS	EFECTOS COLATERALES	
	SOMNOLENCIA	TODOS
DIFENHIDRAM (BENADRYL)	25%	61%
PROMETAZINA (FENERGAN)	35%	65%
TRIPELENAMINA (PBZ)	10%	32%
CLORFENIRAMINA (CLORT)		11%
TENALIDINE (SANDOSTEN)		11%
EN DOBLE CIEGO:		
CLORFENIRAMINA		18%
TERFENADINA (TELDANE)		11%
PLACEBO		8%