

TABLA I

PITIRIASIS VERSICOLOR
Distribución por edad y sexo

Edad	Hombre	Mujer	Total	% mujeres en c/edad
3-6	7	12	19	63
6-12	19	39	58	67
12-18	4	7	11	65
18-24	3	5	8	62
+24	1	3	4	75
	34	66	100	

TABLA II

PITIRIASIS VERSICOLOR

**Tratamiento con tiosulfato
sódico (25%)
2 aplicaciones diarias**

Total 18 pacientes

Negativización para M. furfur.

**En 4 a las 6 semanas
En 3 a las 8 semanas
En 3 a las 12 semanas
En 4 a las 16 semanas
En 4 Positivo a las 20 semanas**

TABLA III

PITIRIASIS VERSICOLOR

Tratamiento con un hexieresorcinalato
(Akrinol) (0,2% dos aplicaciones/día)

Total de pacientes..... 12

Negativización para M. furfur

En 8 a las 8 semanas

En 2 a las 10 semanas

En 1 a las 16 semanas

En 1 positivo a las 20 semanas.

TABLA IV

PITIRIASIS VERSICOLOR

Tratamiento con sulfuro de selenio
(2,5%)

Total de pacientes 70

Negativización para M. furfur

En 52 a los 10 días

En 12 a los 15 días

En 4 a los 20 días

En 2 No volvieron después de 20 ds.