

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD (2)

1974

CAUSAS	CASOS	TASA X 10.000
1.- Enteritis y otras enfermedades diarréicas	7.676	112.4
2.- Bronquitis, enfisema y asma	4.686	71.5
4.- Senilidad sin mención de psicosis	4.297	62.9
5.- Scorpión	3.704	54.8
6.- Otras formas de enfermedad del corazón	3.286	48.1
7.- Influenza	2.712	39.7
8.- Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatales	1.786	26.1
9.- Enfermedades cerebrovasculares	1.631	23.9
10.- Tosferina	1.547	22.1
11.- Síntomas y estados morbosos mal definidos	8.085	118.4
R E S T O	23.119	338.5
T O T A L	64.278	941.1

1975

1.- Enteritis y otras enfermedades diarréicas	6.535	92.5
2.-Bronquitis, enfisema y asma	4.015	56.8
3.- Otras neumonías	3.373	47.3
4.-Senilidad sin mención de psicosis	3.338	47.3
5.-Otras formas de enfermedad del corazón	2.789	39.5
6.-Enfermedades cerebrovasculares	1.467	20.3
7.- Otras causas de morb. y mortalidad perinatales	1.450	20.5
8.-Accidentes de vehículos de motor	1.405	19.3
9.-Anémias	1.359	19.2
10.- Enfermedades espinosas del corazón	1.185	18.2
11.- Síntomas y estados morbosos mal definidos	6.659	94.3
R E S T O	21.370	302.7
T O T A L	64.278	941.1

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD (2)

1976

CAUSAS	CASOS	TASA X 10,000
1.- Enteritis y otras enfermedades diarréicas	7.739	106,9
2.- Bronquitis, enfisema y asma	4.384	60,0
3.- Otras neumonías	4.202	57,5
4.- Senilidad sin mención de psicosis	3.408	46,6
5.- Otras formas de enfermedad del corazón	2.776	38,0
6.- Sarcoídosis	2.611	35,7
7.- Enfermedades cerebrovasculares	3.669	22,8
8.- Otras causas de mortalidad perinatal	1.467	20,1
9.- Influenza	1.435	19,6
10.- Accidentes de vehículos de motor	1.429	19,6
11.- Síntomas y estados mórbidos mal definidos	6.204	94,0
R E S T O	22.085	310,5
T O T A L	60.669	830,3

11.977.

1.- Enteritis y otras enfermedades diarréicas	8.023	106,2
2.- Bronquitis, enfisema y asma	3.930	52,0
3.- Otras neumonías	3.737	49,4
4.- Senilidad sin mención de psicosis	3.067	40,6
5.- Otras formas de enfermedad del corazón	2.870	38,0
6.- Sarcoídosis	1.936	25,6
7.- Enfermedades cerebrovasculares	1792	23,7
8.- Accidentes de vehículos de motor	1.034	21,6
9.- Otras causas de mortalidad perinatal	1.327	17,6
10.- Enfermedades degenerativas del corazón	1.295	17,1
11.- Síntomas y estados mórbidos mal definidos.	6.269	83,0
R E S T O	23.270.	308,0
T O T A L	59.150	732,8

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD (2)

1978

CAUSAS	CASOS	TASA X 10.000h.
1.- Enteritis y otras enfermedades diarréicas	6.892	88.2
2.- Otras neumonías	3.755	48.1
3.- Bronquitis, enfisema y asma	3.575	45.8
4.- Senilidad sin mención de psicosis	3.249	41.6
5.- Otras formas de enfermedad del corazón	2.915	37.3
6.- Enfermedades cerebrovasculares	1.963	23.8
7.- Accidentes de vehículos de motor	1.817	23.3
8.- Enfermedades degenerativas del corazón	1.386	17.7
9.- Otras causas de letalidad y mortalidad perinatal	1.330	17.0
10.- Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales	1.153	14.8
11.- Síntomas y estados morboso no definidos	6.113	78.2
R E S T O	22.553	288.6
T O T A L	56.601	724.4

El Comercio, julio 8/84 Mortalidad infantil llegó al 68.2 por mil en 1979

La tasa de natalidad se situó a 1979 en el 29.9 y la mortalidad en 7.7 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC.

De acuerdo con el anuario de Estadísticas Vitales puesto a circulación en los últimos días se registraron en el mismo año 232.436 nacimientos y 59.951 defunciones. Agrega que la mortalidad infantil alcanzó a 15.845 niños, es decir una tasa de 68.2 fallecimientos por cada mil nacidos vivos.

Las tasas más altas de natalidad se registraron en las provincias de Manabí con 34.817 nacidos vivos y una tasa de 40.9; y, la provincia de Bolívar con 5.850 nacimientos y una tasa de 40.6 nacidos vivos por cada mil habitantes, explica la investigación.

En cambio las tasas de mortalidad más altas se registraron en las siguientes provincias: Cotopaxi, con 4.418 fallecidos y una tasa de 16.2; Chimborazo, con 4.738 y una tasa de 14.8; Imbabura, con 3.135 fallecidos y una tasa de 13.2; Tungurahua, con 3.759 fallecidos y una tasa de 11.8; Bolívar, con 1.561 fallecidos y una tasa de 10.8; y, Loja con 4.327 fallecidos y una tasa de 10.1 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Hemos

citado únicamente las provincias con mayor tasa de mortalidad general.

En cuanto a la mortalidad infantil su mayor registro se produjo en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura con tasas de 118.6, 95.1 y 94.0 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos. Otras provincias con altas tasas de mortalidad infantil son: Tungurahua, con una tasa de 89.3; Esmeraldas, con 86.0; Pichincha, con 79.2; Azuay, con 72.9; y, Zamora Chinchipe, con una tasa de 77.2 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos.

En lo que se refiere a las defunciones por causa de muerte ocupan un primer lugar los fallecidos por enfermedades infecciosas y parasitarias que registró 12.774 fallecidos, siendo las "enfermedades intestinales" que registran 7.629 fallecidos, luego tenemos los fallecidos por "enfermedades del aparato circulatorio" con 7.033 fallecidos; los muertos por neumonía con 3.723 casos; bronquitis, enfisema y asma 3.394 fallecidos; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 3.403 fallecidos; y, 3.217 fallecidos por tumores malignos, siendo el de mayor incidencia el tumor maligno del estómago. Estas defunciones han sido tomadas de la lista abreviada de 50 grupos.

Bajan tasas de natalidad y mortalidad

El Comercio, julio 8/84

La tasa de natalidad bajó a 29.9 y la de mortalidad se situó en 7.7 fallecimientos por cada mil habitan-

tes, según el Anuario de Estadísticas Vitales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según ese Anuario, correspondiente a 1979, se registraron 232.436 nacimientos y 59.951 defunciones en el país. Entre tanto la tasa de mortalidad se situó en 7.7 fallecidos por cada mil habitantes y la natalidad tuvo una tasa de 29.9 nacidos vivos por cada mil habitantes; la mortalidad infantil, que para este año tuvo 15.845 fallecidos, alcanzó la tasa de 68.2 fallecidos por cada mil nacidos vivos.

Las tasas más altas de natalidad se registraron en las provincias de Manabí con 34.817 nacidos vivos y una tasa de 40.9; y, la provincia de Bolívar con 5.850 nacimientos y una tasa de 40.6 nacidos vivos por cada mil habitantes.

En cambio las tasas de mortalidad más altas se registraron para el año de esta investigación, en las siguientes provincias: Cotopaxi con 4.418 fallecidos y una tasa de 16.2; Chimborazo

con 4.738 y una tasa de 14.8; Imbabura con 3.135 fallecidos y una tasa de 13.2; Tungurahua con 3.759 fallecidos y una tasa de 11.8; Bolívar con 1.561 fallecidos y una tasa de 10.8; Loja con 4.327 fallecidos y una tasa de 10.1 fallecidos por cada 1.000 habitantes. Hemos citado únicamente las provincias con mayor tasa de mortalidad general.

En cuanto a la mortalidad infantil su mayor registro se produjo en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura con tasas de 118.6, 95.1 y 94.0 fallecidos por cada 1.000 habitantes vivos. Otras provincias con altas tasas de mortalidad infantil son: Tungurahua con una tasa de 89.3; Esmeraldas con 86.0, Pichincha con 79.2; Azuay con 72.9 y Zamora Chinchipe con una tasa de 77.2 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos.

En el cuadro correspondiente a

contrarios que ocupa un primer lugar los fallecidos por enfermedades infecciosas y parasitarias que registró 12.774 fallecidos, siendo las "enfermedades intestinales" que registran 7.629 fallecidos, luego tenemos los fallecidos por "enfermedades del aparato circulatorio" con 7.033 fallecidos; los muertos por neumonía con 3.723 casos; bronquitis, enfisema y asma 3.394 fallecidos; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 3.403 fallecidos; y, 3.217 fallecidos por tumores malignos, siendo el de mayor incidencia el tumor maligno del estómago. Estas defunciones han sido tomadas de la lista abreviada de 50 grupos.

Aquí se ha resumido la información que trae el Anuario de Estadísticas Vitales, correspondiente a 1979, la información de 1980 para efectos de comparación, será entregada próximamente.