



## REALIDAD DE LA SALUD EN EL ECUADOR

Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN 2004 y otras fuentes

Quito, septiembre de 2006

---

---

---

---

---

---

---



### Mortalidad materna

- Promedio nacional **67 mujeres** mueren por cada 100.000 nacidos vivos
- Cifras mayores en área rural, mujeres pobres y con menor acceso a educación
- **77,9% de las muertes maternas** se dieron por causas obstétricas directas

---

---

---

---

---

---

---



### Mortalidad materna

- En el año 2002 (INEC.2002:12), de **149 muertes maternas** registradas:
  - 3** son niñas de 10 a 14 años
  - 27** fueron adolescentes de 15 a 19 años
- El **20%** de muertes maternas corresponden a niñas y adolescentes.

---

---

---

---

---

---

---



### Adolescentes y jóvenes

- 8% de mujeres de 15 a 24 años ha tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años; esta cifra aumenta al 30% antes de los 18 años y a 46.2% antes de cumplir los 25 años.

---

---

---

---

---

---

---



### Adolescentes y jóvenes

- El desconocimiento y la desinformación de las/os jóvenes sobre los riesgos de una sexualidad temprana y sobre los métodos para la regulación de la fecundidad, producen embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.

---

---

---

---

---

---

---



### Adolescentes y jóvenes

- La edad de la primera relación sexual decrece a medida que aumentan los años de educación; igualmente es importante destacar el cuanto más bajo es el nivel económico, las mujeres inician relaciones sexuales a más temprana edad.

---

---


---

---

---

---

---

 **Embarazo en adolescentes**

- El embarazo en mujeres menores de 18 años constituye por la edad una causa de alto riesgo obstétrico y de muerte materna.
- En 1994, 7.9% de adolescentes de entre 15 y 19 años tuvieron un embarazo; en 1998 se eleva al 9.8%; en el 2003 8.7%.
- En el 2003 las adolescentes entre 12 y 19 años constituyen el 16.0% de las mujeres embarazadas del país.

SIISE, y Mujeres y Hombres en Cifras

---

---

---


---

---

---

---

---

 **Embarazo en adolescentes**

- Entre las mujeres de 15 a 24 años (en niños nacidos vivos), 87.5% quería tener hijos/as al momento de quedar embarazada, 80% no quería quedarse embarazada todavía y 88.4% definitivamente no quería tener hijos/as.

---

---

---


---

---

---

---

---

 **Embarazo en adolescentes**

Edad al primer embarazo	En niños nacidos vivos	Pérdida	Nacidos muertos	Aún embarazadas	No. Casos
Menos de 15	88.9%	9.4%	0.0%	1.7%	128
15 a 17 años	89.6%	4.6%	1.3%	5.5%	742
18 a 19 años	87.7%	4.8%	0.7%	6.9%	478
20 a 24 años	74.7	8.6%	0.0%	16.7	332

---

---

---

---

---

---

---

---



### Embarazo adolescente

- Problema mayor en las áreas rurales y más frecuentes en las adolescentes de menor instrucción: 32.3% de las adolescentes sin ningún nivel de instrucción y un 16.7% con instrucción primaria incompleta ya eran madres.

---

---

---

---

---

---

---



### Embarazo en adolescentes

Fuente: Hospital Enrique Sotomayor  
Guayaquil

Año	Partos de adolescentes (- 15 a 19 años)	Total de partos
2005	12758	33135
Enero a junio 2006	5129	16880



---

---

---

---

---

---


---



### Partos de adolescentes en los 3 últimos años

Fuente: Hospital Enrique Sotomayor

Año	Número de partos
2003	10.012
2004	12.147
2005	12.758



---

---

---

---

---

---

---





### Anticonceptivos

- 96% de mujeres de 15 a 49 años conocen o han oído hablar de algún método anticonceptivo.
- Los más conocidos son las pastillas, la esterilización femenina, los condones, el DIU y la inyección.

---

---

---

---

---

---

---



### Anticonceptivos

- 73 de cada 100 mujeres ecuatorianas en unión de 15 a 49 años usan algún método anticonceptivo (72.7%)
- Incremento en el uso de métodos anticonceptivos es del orden del 116% (en relación a 1979)
- 58.7% usan métodos modernos y un 14% a métodos tradicionales de menor eficacia (ritmo, retiro y MELA).

---

---

---

---

---

---

---



### Anticonceptivos

- En el área urbana 76.6% usan métodos anticonceptivos; en el área rural 67.1%.
- Bajo uso de anticonceptivos en Azuay (59.3%) y Cañar (52.4%).
- Uso de métodos tradicionales es mayor al 20% en Carchi, Imbabura, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Loja.

---

---

---

---

---

---

---



### Anticonceptivos

- A mayor educación mayor uso: 79.9% en mujeres que tienen educación superior o postgrado, 51% de mujeres sin educación formal.
- A mayor nivel económico mayor uso: 77.8% de mujeres de hogares altos los usan mientras que las del nivel bajo llegan a un 64.9%.

---

---

---

---

---

---

---



### Violencia

- 7 % de las mujeres de 15 a 49 años de edad reportó que en el transcurso de su vida fue violada (con penetración).
- 4 % mencionó alguna situación de abuso sexual (violación sin penetración).
- El 80% de las denuncias recibidas por las Juntas de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes corresponden a violencia infantil en el ámbito educativo (Lazo: 2005. s/ref.).

---

---

---

---

---

---

---



### Violencia

- 121 de cada 1000 jóvenes han sufrido besos y caricias no deseadas
- 32 de cada 1000 jóvenes han sido violados
- 27 de cada 1000 han vivido experiencias de violencia sexual oral y genital. (CEPAM Quito. 2003: 46).

---

---

---

---

---

---

---



## Enfermedades de transmisión sexual

Fuente: Dirección Provincial de Salud del Guayas

Enfermedad	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Sífilis congénita	22	55	28	33	39	38	21	21
Sífilis primaria - secundaria	425	741	576	808	751	526	874	718
Gonococcosis	1.824	1838	1751	1816	1802	1732	1859	1788
Tricomonas genital	816	1038	1011	887	883	827	734	762
Total	358	258	258	219	240	227	240	258

Gráfico de distribución de enfermedades de transmisión sexual

